


◎サロマ湖付着生物ラーバ出現状況

イガイ(シュウリガイ)ラーバは4地点平均で1,304個/ト出现、そのうち付着サイズは35個/ト出现しており、先週よりも増加していました。

ホヤ類についてはエボヤが99個/ト、ユウレイボヤが16個/ト、ザラボヤが122個/ト出现しており、ザラボヤとエボヤについては例年よりも多く出现しています。



付着物ラーバの出現状況

イガイラーバ	St. 1	St. 4	St. 5	St. 8	平均
140 ~ 150	31	0	2	21	14
150 ~ 160	94	0	5	53	38
160 ~ 170	624	0	7	59	172
170 ~ 180	1,965	1	5	16	497
180 ~ 190	1,341	4	14	5	341
190 ~ 200	343	3	20	5	93
200 ~ 210	94	1	9	5	27
210 ~ 220	31	7	5	5	12
220 ~ 230	62	4	9	21	24
230 ~ 240	0	18	16	11	11
240 ~ 250	31	30	34	16	28
250 ~ 260	0	9	21	16	12
260 ~ 270	62	3	14	5	21
270 ~ 280	0	7	7	0	3
280 ~ 290	0	5	4	0	2
290 ~ 300	0	10	23	0	8
合計	4,678	102	196	240	1,304
200 μm以上	281	94	142	80	149
	6%	92%	73%	33%	11%
260 μm以上	62.4	24.9	48.0	5.3	35.2
	1.3%	24.4%	24.5%	2.2%	2.7%
ザラボヤ	13	98	163	123	99
ユウレイボヤ	9	25	14	17	16
エボヤ	17	312	128	29	122

