


◎サロマ湖付着生物ラーバ出現状況

イガイ（シュウリガイ）ラーバは4地点平均で1,961個/ト出現、そのうち付着サイズは134個/ト出現しており、先週よりも大幅に増加しました。

ホヤ類についてはザラボヤが30個/ト、ユウレイボヤが9個/ト、エボヤが29個/ト出現しており、いずれも先週より減少しました。



付着物ラーバの出現状況

イガイラーバ	St. 1	St. 4	St. 5	St. 8	平均
140 ～ 150	0	110	81	3	48
150 ～ 160	77	110	54	3	61
160 ～ 170	38	75	81	3	49
170 ～ 180	38	12	27	17	24
180 ～ 190	0	17	27	14	15
190 ～ 200	77	23	36	23	40
200 ～ 210	308	12	36	20	94
210 ～ 220	654	23	27	17	180
220 ～ 230	923	35	18	17	248
230 ～ 240	1,576	6	81	23	421
240 ～ 250	1,653	41	189	49	483
250 ～ 260	308	87	243	20	164
260 ～ 270	0	110	144	9	66
270 ～ 280	77	64	45	3	47
280 ～ 290	0	0	9	0	2
290 ～ 300	38	0	36	0	19
合計	5,767	725	1,132	220	1,961
200 μm 以上	5,537 96%	377 52%	826 73%	157 71%	1,724 88%
260 μm 以上	115.3 2.0%	174.1 24.0%	233.5 20.6%	11.4 5.2%	133.6 6.8%
ザラボヤ	8	52	26	33	30
ユウレイボヤ	1	14	16	4	9
エボヤ	19	19	23	54	29

