


◎サロマ湖付着生物ラーバ出現状況

9月3日に湖内4地点で付着生物のラーバを調査した結果、イガイ（シュウリガイ）ラーバは平均で2,223個/ト出现しており、このうち付着サイズは平均で2個/ト出现していました。


ホヤ類についてはザラボヤが38個/ト、ユウレイボヤが66個/ト、エボヤが20個/ト出现しており、ザラボヤとユウレイボヤが増加していました。




付着物ラーバの出現状況

イガイラーバ	St. 1	St. 4	St. 5	St. 8	平均
140 ~ 150	173	2,477	207	967	956
150 ~ 160	156	1,008	155	752	518
160 ~ 170	75	924	96	304	350
170 ~ 180	52	504	89	90	184
180 ~ 190	87	210	81	143	130
190 ~ 200	58	0	37	18	28
200 ~ 210	29	42	15	54	35
210 ~ 220	17	0	0	0	4
220 ~ 230	6	0	0	0	1
230 ~ 240	17	0	0	18	9
240 ~ 250	12	0	0	0	3
250 ~ 260	6	0	7	0	3
260 ~ 270	0	0	0	0	0
270 ~ 280	0	0	7	0	2
280 ~ 290	0	0	0	0	0
290 ~ 300	0	0	0	0	0
合計	687	5,164	695	2,345	2,223
200 μm以上	87	42	30	72	57
	13%	1%	4%	3%	3%
260 μm以上	0	0	7	0	2
	0%	0%	1%	0%	0%
ザラボヤ	4	59	31	57	38
ユウレイボヤ	4	81	153	25	66
エボヤ	6	15	52	6	20


ザラボヤの出現状況（硬い水ホヤ）



ユウレイボヤの出現状況（水ホヤ・はなたれ）



エボヤの出現状況（いぼホヤ）



付着サイズのイガイラーバ出現状況

