


◎サロマ湖付着生物ラーバ出現状況

9月16日に湖内4地点で付着生物のラーバを調査した結果、イガイ（シュウリガイ）ラーバは平均で1,276個/ト出现しており、そのうち付着サイズは16個/ト出现していました。

ホヤ類についてはザラボヤが11個/ト、ユウレイボヤが55個/ト、エボヤが11個/ト出现しており、ユウレイボヤが増加傾向です。



付着物ラーバの出現状況

イガイラーバ	St. 1	St. 4	St. 5	St. 8	平均
140 ~ 150	23	22	391	145	145
150 ~ 160	14	88	568	357	257
160 ~ 170	37	88	320	334	195
170 ~ 180	29	55	142	234	115
180 ~ 190	12	121	107	111	88
190 ~ 200	18	44	71	100	58
200 ~ 210	29	88	195	100	103
210 ~ 220	20	99	89	67	69
220 ~ 230	25	55	160	100	85
230 ~ 240	18	110	71	22	55
240 ~ 250	4	121	53	11	47
250 ~ 260	12	110	36	11	42
260 ~ 270	2	11	18	0	8
270 ~ 280	2	11	0	0	3
280 ~ 290	0	11	0	0	3
290 ~ 300	0	11	0	0	3
合計	246	1,044	2,219	1,594	1,276
200 μm以上	113 46%	626 60%	621 28%	312 20%	418 33%
260 μm以上	4 2%	44 4%	18 1%	0 0%	16 1%
ザラボヤ	5	23	6	12	11
ユウレイボヤ	11	103	35	72	55
エボヤ	11	21	10	3	11

